

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

AN THÂN BỔ TÂM

* Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*, *Để xa tầm tay trẻ em*

* Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ, những lúc đang
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*

A./ Hướng dẫn cho người bệnh

Công thức bào chế cho (1 viên nang cứng)

Mỗi viên nang cứng chứa 129,6mg cao hỗn hợp dược liệu quy về khô
và 324mg bột được liệu tương đương với:

Huyền sâm	36mg	Mạch môn	72mg	Thiên môn đông	72mg
Cam thảo	36mg	Đương quy	72mg	Bá tử nhân	72mg
Đảng sâm	36mg	Cát cánh	36mg	Táo nhân	72mg
Đan sâm	36mg	Bạch linh	36mg	Ngũ vị tử	72mg
Viễn chí	36mg	Sinh địa	288mg		

Tá dược: bột tacl, tinh bột sắn, magnesi stearat, natri benzoat... vừa đủ 1 viên.

Mô tả sản phẩm: viên nang cứng, cốm thuốc thuốc bên trong màu nâu xám,
mùi thơm dược liệu, vị đắng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên/ 60 viên/ 100 viên

Khi nào nên dùng thuốc này (chỉ định điều trị) Hộp 3 vỉ x 10 viên/ Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc có tác dụng bổ tâm an thần. Dùng trong các trường hợp tim đập
nhANH, đánh trống ngực, hay quên, mất ngủ, ngủ hay mê, táo bón.

Liều dùng: Trẻ em từ 5 tuổi đến 10 tuổi, mỗi lần uống 1 viên

Từ 10 tuổi đến 15 tuổi, mỗi lần uống 2 viên

Từ 15 tuổi trở lên, mỗi lần uống 3 viên

Cách dùng: Ngày uống 2 lần, uống với nước đun sôi để nguội, uống sau bữa ăn

Đường dùng: đường uống.

Khi nào không dùng thuốc này (chống chỉ định)

Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai. Những người mẫn cảm với bất kỳ
thành phần nào của thuốc. Người trầm cảm, đang vận hành máy móc, tàu xe.

Thận trọng khi dùng thuốc đối với các trường hợp bụng chướng, tiêu chảy.

Tác dụng không mong muốn: "chưa thấy có báo cáo" **SDK: VD-28575-17**

Thuốc hoặc thực phẩm nên tránh dùng khi đang sử dụng thuốc: thức ăn nhiều dầu mỡ.

Trường hợp quên không dùng thuốc 1 lần thì cứ tiếp tục uống tiếp liều tiếp theo
không cần bù liều.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Dấu hiệu và triệu chứng khi dùng quá liều “chưa có tài liệu báo cáo”

Nếu nghi ngờ quá liều, hãy liên hệ ngay với bác sĩ hoặc dược sĩ.

Trường hợp dùng quá liều khuyến cáo thì nên theo dõi tình trạng người bệnh tại nhà, nếu có dấu hiệu bất thường nên đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Thận trọng khi dùng thuốc đối với các trường hợp âm hư huyết nhiệt.

Các trường hợp đang có thai hoặc có các triệu chứng bất thường thì nên ngưng dùng thuốc và tham vấn bác sĩ, dược sĩ.

Hạn dùng : 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Dùng thuốc không quá 30 ngày kể từ ngày mở nắp.

B/. Hướng dẫn cho cán bộ y tế

Công năng : Tư âm dưỡng huyết, bổ tâm an thần..

Chủ trị: Âm huyết bất túc, hồi hộp hay quên, tâm phiền mất ngủ, ngủ hay mê, táo bón.

Liều dùng: Trẻ em từ 5 tuổi đến 10 tuổi: mỗi lần uống 1 viên.

Từ 10 tuổi đến 15 tuổi: mỗi lần uống 2 viên.

Từ 15 tuổi trở lên: mỗi lần uống 3 viên.

Cách dùng: Ngày uống 2 lần, uống với nước đun sôi để nguội, uống sau bữa ăn.

Đường dùng: Uống.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai.

Những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người trầm cảm, đang vận hành máy móc, tàu xe.

Thận trọng khi dùng thuốc đối với các trường hợp tỳ vị hư hàn, tiêu chảy, bụng đầy.

Tương tác thuốc: “chưa có tài liệu báo cáo”

ĐỂ TRÁNH NHỮNG TƯƠNG TÁC CÓ THỂ CÓ GIỮA NHIỀU THUỐC, PHẢI BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ BIẾT TẤT CẢ CÁC THUỐC MÀ BẠN ĐANG DÙNG

Tác dụng không mong muốn chưa thấy có báo cáo.

Quá liều và cách xử lý: “ tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời”

Các trường hợp có các triệu chứng bất thường thì nên ngưng dùng thuốc và tham vấn bác sĩ, dược sĩ “ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ”

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM **PHƯỚC SANH PHARMA**

272C - KHU 3 THỊ TRẤN ĐỨC HÒA
HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.