

Antesik®

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thành phần: Mỗi viên có chứa:

Berberin clorid.....50 mg
Bột rễ Mật hương (*Pulvis Radicis Saussureae lappae*).....200 mg
Tá dược (Lactose monohydrat, tinh bột sắn, eragel, talc, magnesi stearat, aerosil) vừa đủ 1 viên

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, một đầu màu vàng, một đầu màu xanh.

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 4 viên (vỉ Alu/Alu). Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ PVC/nhôm)

Thuốc dùng cho bệnh gì:

- Viêm đại tràng

- Rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, ợ

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:

- Người lớn: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 2 viên.

- Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

Khi nào không nên dùng thuốc này:

- Người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai

Tác dụng không mong muốn: Thuốc có thể gây táo bón.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc:

- Nếu dùng các thuốc khác nên uống cách xa từ 1 đến 2 giờ.

Cần làm gì khi quên một lần không dùng thuốc:

- Nếu quên một lần không uống thuốc, có thể uống lại ngay sau khi nhớ, hoặc có thể bỏ qua để uống liều kế tiếp nhưng không được uống gấp đôi để bù lại liều đã quên. Tổng liều uống trong ngày không vượt quá liều khuyến cáo.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

- Chưa có thông tin

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

- Chưa có thông tin. Cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

- Không dùng quá liều chỉ định.

- Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú nên dùng thận trọng.

- Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc: Chưa có ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi hoặc chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác.

- Thuốc có chứa Lactose: Bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về dung nạp galactose, chứng thiếu hụt lactase Lapp hoặc rối loạn hấp thu glucose-galactose không nên sử dụng thuốc này.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ:

- Cần thông báo cho bác sĩ, dược sĩ khi gặp bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong khi sử dụng thuốc.

- Bệnh nhân bị dị ứng với bất kỳ loại thức ăn nào hoặc bị rối loạn dung nạp với một số loại đường.

Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến thầy thuốc

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

358 đường Giải Phóng, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: NMDP số 2, Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 024.36686111; Fax: 024.38641584



Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế

GMP-WHO

Antesik®

Thành phần: Mỗi viên có chứa:

Berberin clorid.....50 mg
Bột rễ Mộc hương (*Pulvis Radicis Saussureae lappae*).....200 mg
Tá dược (Lactose monohydrat, tinh bột sắn, eragel, talc, magnesi stearat, aerosil) vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 4 viên (vỉ Alu/Alu).
Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ PVC/nhôm)

Dược lực học:

- Berberin là một alkaloid có trong nhiều loại thực vật khác nhau. Nó có tác dụng ức chế đối với một số vi khuẩn đường ruột.
- Rễ Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) vị đắng, cay, tính ấm, quy vào các kinh tì vị, đại tràng, gan. Tác dụng hành khí, chỉ thống, kiện tì hòa vị. Chủ trị các chứng khí trệ ở tì vị gây kém ăn, đầy trướng, đau bụng, nôn mửa, lỵ, tiêu chảy.

Dược động học:

Berberin hấp thu chậm qua đường tiêu hóa và không hoàn toàn.

Chỉ định: Thuốc dùng trong các trường hợp:

- Viêm đại tràng
- Rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, lỵ

Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn: Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên.

Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai.

Tác dụng không mong muốn:

Trong một số trường hợp thuốc có thể gây táo bón.

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

- Thuốc có chứa Lactose: Bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về dung nạp galctose, chứng thiếu hụt lactase Lapp hoặc rối loạn hấp thu glucose-galactose không nên sử dụng thuốc này.

- Người có thai: Không nên dùng
- Phụ nữ cho con bú: Dùng thận trọng
- Người lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

- Chưa có thông tin

Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn: TCCS



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: NMDP số 2, Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
MEDIPANTEX ĐT: 024.36686111; Fax: 024.38641584