

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG - ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

R_x

BÀI THẠCH DANAPHA

TÊN THUỐC: BÀI THẠCH DANAPHA

THÀNH PHẦN - HÀM LƯỢNG: Mỗi viên nén bao phim chứa

Thành phần hoạt chất

- Cao khô Kim tiền thảo 90 mg

Tương ứng với 1000 mg Kim tiền thảo (*Herba Desmodii styracifolii*)

- Cao khô hỗn hợp 230 mg

Tương ứng với

+ 250 mg Nhân trần (*Herba Artemisia capillaris*)

+ 150 mg Hoàng cầm (*Radix Scutellariae*)

+ 250 mg Nghệ (*Rhizoma Curcumae longae*)

+ 100 mg Bình lang (*Semen Arecae catechi*)

+ 100 mg Chỉ thực (*Fructus Aurantii immaturus*)

+ 100 mg Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*)

+ 500 mg Bạch mao căn (*Rhizoma Imperatae cylindrica*)

- Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 100 mg

- Đại hoàng (*Rhizoma Rhei*) 50 mg

Thành phần tá dược

Lactose monohydrat, Eragel, povidon K30, MCC 102, DST, Aerosil, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615, maltodextrin, talc, titan dioxyd, PEG 400, màu oxyd sắt đen, màu oxyd sắt đỏ.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén hình oval, bao phim màu nâu, mặt viên nhẵn bóng, cạnh và thành viên lảnh lặn, nhân màu nâu.

TÁC DỤNG

Ức chế sự hình thành sỏi, bào mòn sỏi ở thận bằng cách tăng lượng nước tiểu, giảm bài tiết canxi và tăng bài tiết citrat trong nước tiểu.

Tăng tiết mật, kích thích co bóp.

Kháng viêm, giảm đau.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị sỏi thận - tiết niệu, sỏi mật, viêm túi mật.

- Phòng ngừa tái phát, đặc biệt là sau khi tán sỏi hoặc mổ lấy sỏi.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG

Cách dùng

Uống với nhiều nước, trước bữa ăn.

Liều dùng

Dùng theo chỉ dẫn của Bác sĩ hoặc dùng liều trung bình là

- Để tống sỏi: Ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên.

- Để điều trị viêm và phòng ngừa tái phát: Ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

- Sử dụng thận trọng đối với bệnh nhân suy nhược, tổn thương chức năng gan.

- Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

- Thuốc có chứa lactose, những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase, hoặc kém hấp thu glucose - galactose không nên dùng thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.
Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Không có thông tin. Chỉ nên sử dụng thuốc khi thật cần thiết.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí: Trường hợp quá liều, tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

DƯỢC LỰC HỌC

BÀI THẠCH DANAPHA được phối hợp từ nhiều loại dược liệu có tác dụng bổ sung hiệp đồng với nhau.

- Kim tiền thảo: Lợi tiểu, tiêu viêm, bào mòn sỏi. Tác dụng của kim tiền thảo được tăng cường và dễ dàng hơn khi được phối hợp với các dược liệu khác có trong công thức.

- Nhân trần, bình lang và đại hoàng: Làm tăng tiết mật, kích thích co bóp.

- Hoàng cầm, nghệ: Kháng sinh, kháng viêm.

- Mộc hương, chỉ thực, hậu phác: Hành khí, giảm đau.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không có thông tin.

DẤU HIỆU LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO KHI DÙNG THUỐC

- Uống thuốc trước bữa ăn, uống với nhiều nước.

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng.

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- Thuốc đóng trong lọ 45 viên, hộp 1 lọ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

- Thuốc đóng trong lọ 1000 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

- Thuốc ép trong vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

- Thuốc ép trong vỉ 10 viên, hộp 5 vỉ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

28/01/2022

Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng - Việt Nam

Tel: 0236.3760130/0236.3760131 Fax: 0236.3760127

Email: info@danapha.com

Và phân phối trên toàn quốc