

Hướng dẫn sử dụng thuốc

BỔ GAN P/H

BỔ GAN P/H là sản phẩm thuốc kế thừa kinh nghiệm điều trị bệnh Gan bằng các vị thuốc nam của Y học cổ truyền với những thành quả nghiên cứu khoa học của Việt Nam và Thế giới. **BỔ GAN P/H** có tác dụng: bảo vệ tế bào gan, phục hồi chức năng gan, hạ men gan, giải độc gan. Trị viêm gan virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính.

THÀNH PHẦN: Công thức bào chế cho 1 viên

Cao đặc Diệp hạ châu (*Extractum Herbae Phyllanthi urinariae*):.....125mg
(Tương đương 1,25g dược liệu)

Cao đặc Bồ bồ (*Extractum Herbae Adenosmatis indiani*):.....100mg
(Tương đương 1g dược liệu)

Cao đặc Chi tử (*Extractum Fructi Gardeniae*):.....25mg
(Tương đương 0,25g dược liệu)

Tá dược: Tinh bột sắn, Calci carbonat, Đường kính, Magnesi stearat, Lactose, Talc, Avicel, Nipagin, Nipasol, Sắt oxyd đỏ, Sắt oxyd vàng, Carnauba wax, PVP K30, ethanol 96%, nước tinh khiết, Sáp ong trắngvd 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao đường.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 5 vỉ x 20 viên.

CHỈ ĐỊNH:

- Bảo vệ và giải độc gan do dùng nhiều bia rượu, chống dị ứng, mẩn ngứa, nổi mề đay.
- Phục hồi chức năng gan do suy giảm chức năng gan, viêm gan gây mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, táo bón.
- Hạ men gan, điều trị viêm gan virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG:

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 5 viên, uống sau bữa ăn
- Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên
- Đợt điều trị 10 - 12 tuần

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho phụ nữ có thai

TÁC DỤNG PHỤ: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

THẬN TRỌNG: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

DÙNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Sản xuất và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: 96 - 98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy GMP WHO: C CN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Tel: 024.33826222 * Fax: 024.33978024
Website: www.dongduocphuchung.com.vn



Điện thoại tư vấn
1800 545435