

ĐAN SÂM - TAM THẤT

Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng

Để Xa Tầm Tay Trẻ Em

Thông Báo Ngay Cho Bác Sĩ Hoặc Dược Sĩ

Những Tác Dụng Không Mong Muốn Gặp Phải Khi Sử Dụng Thuốc

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên bao phim chứa:

Cao khô hỗn hợp dược liệu 200 mg

(Tương ứng với:

Đan sâm (*Radix Salviae miltorrhizae*) 1000 mg

Tam thất (*Radix Panasis notoginseng*) 70 mg)

Tá dược vừa đủ 01 viên

(Lactose, bột talc, magnesi stearat, ethanol 96%, DST,

Pharmacoat 606, màu Ponceau 4R)

PHƯƠNG NGHĨA:

* **Cấu trúc:** Phương thuốc được cấu tạo từ hai vị thuốc:

Đan sâm và Tam thất là những vị thuốc đã được sử dụng lâu đời và nghiên cứu khá kỹ lưỡng những năm gần đây.

* Dược tính:

- Đan sâm có tác dụng hoạt huyết, bổ huyết, an thần. Đặc biệt có tác dụng rất đặc hiệu trên tim và mạch vành. Chủ trị:

+ Các chứng đau do huyết ứ trệ, rối loạn vận mạch (đau cơ, co thắt động mạch vành tim, đau đầu), di chứng tai biến mạch máu não, phụ nữ bế kinh, thống kinh, chấn thương tụ huyết.

+ Huyết hư, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, giấc ngủ không sâu, khó ngủ, ít ngủ.

- Tam thất có tác dụng tiêu ứ chỉ huyết, bổ huyết, tiêu viêm. Chủ trị:

+ Xuất huyết, ứ huyết: xuất huyết đường tiêu hóa (dạ dày, ruột...), đứt mạch máu não, di chứng tai biến mạch máu não, cơn đau do huyết ứ trệ (đau đầu do rối loạn vận mạch, đau do thắt động mạch vành tim, đau do rối loạn tuần hoàn ngoại biên...), chấn thương tụ huyết (do tai nạn, va đập...).

+ Một số chứng viêm do tụ huyết.

+ Huyết hư: Thiếu máu, suy nhược cơ thể. Tam thất có tác dụng “tiêu huyết cũ, sinh huyết mới” nên nó là vị thuốc rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh.

* **Phối ngũ:** Sự phối hợp 2 vị thuốc làm tăng cường hiệu lực lưu thông huyết mạch, bổ huyết, hiệp đồng tác dụng giữa 2 vị thuốc.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên bao phim.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 40 viên bao phim.
TÁC DỤNG: Hoạt huyết, khử huyết ú, hành khí giảm đau.

CHỈ ĐỊNH:

- Phòng và trị chứng đau thắt ngực, đau nhói vùng tim do huyết ú, thiếu năng mạch vành, cảm giác ngột ngạt trong ngực.

- Đau đầu do huyết ú (đau nhói từng cơn), thiếu năng tuần hoàn não, sa sút trí nhớ do lưu thông máu não kém.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai hoặc hành kinh, người sốt cao, chảy máu, sốt xuất huyết và trẻ em dưới 15 tuổi không nên dùng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa thấy tác dụng không mong muốn.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Nên tránh dùng ớt, đồ cay nóng khi đang sử dụng thuốc này.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC
(người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác): Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi.

KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC: Uống thêm 1 liều trong thời gian kế tiếp.

QUÁ LIỀU:

- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Nóng nực, căng thẳng.

- Cách xử trí khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều thì ngừng, uống thuốc mát: đại bổ âm, lục vị.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Sản phẩm có bán online tại: www.vanxuanpharma.com.vn

Liên hệ Hotline: 0931.288.789. Giao hàng toàn quốc

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN

231 Chiến Lược, KP. 18, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất tại: Đường số 3, Cụm CN Liên Hưng, Ấp Bình Tiền 2,
Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

ĐT/Fax: (028) 37624848 - Website: vanxuanpharma.com.vn