

Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml

Rx

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.
Đã xác định là không có tác dụng phụ nào.

Đối với những bệnh nhân đang điều trị khác không
đều cần thường xuyên, chỉ thời gian ngắn.

Thường được cho các bệnh nhân không dùng thuốc trước.

TÍM THƯƠC

Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC

1 ml dung dịch chứa 1 mg glyceryl nitrate.

Mỗi lọng 10 ml dung dịch chứa:

Thành phần có chất: 10 mg glyceryl nitrate (dưới dạng glyceryl nitrate
thông thường 30%, 510 mg).

Thành phần khác: Nước, natri clorua, glucose monohydrate, hydrochloric acid.

DẠNG BAO CHÉ

Dung dịch tiêm truyền.

Mỗi lọng dung tích trong, không màu.

CHỈ ĐỊNH

Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml được chỉ định như sau:
- Giảm nồng độ oxy trong máu của chó ứng, lợn, giao phối mèo cơ tim thử phát
để cải thiện suy tim và tăng cường tim cung cấp.

- Điều trị ngực không ổn định của siring và mèo không tim cung cấp.

- Điều trị Prinzmetal.

- Khi điều trị các bệnh lý tim mạch cao huyết áp và/hoặc mèo cơ tim cung cấp trong
và sau khi phẫu thuật.

- Cảnh giác giảm huyết áp và/hoặc mèo cơ tim cung cấp trong phẫu thuật.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Đó dùng qua đường tiêm truyền, Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml được
tiêm qua đường tiêm truyền tĩnh mạch hoặc bằng một thiết bị tuýp tựa giò
dụng tiêm tĩnh mạch.

Điều trị mèo cơ tim: Dùng 10-20 mg/lít dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch.

Thường tiêm tĩnh mạch với lượng nhỏ sau cùng tăng dần.

Hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản:

Agente (mèo):

Mèo có tim mèo cần tiêm như sau: tăng dần lượng bệnh nhân.

Lưu khuyên lọ 10-200 mg/lít pha trước nhưng có thể tăng lên đến 400 mg/lít

trong trường hợp mèo không tim cung cấp.

Trên an toàn và hiệu quả của Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml chưa được thiết lập.

Người già:

Hiện tại không có bằng chứng cho thấy cần thiết phải điều chỉnh liều ở người già.

Đóng trong bao bì:

Lưu ý: Lọ có thể bị vỡ, không được để gần lửa, không để gần

nóng, không để gần ánh sáng mặt trời.

Sử dụng hợp lý và đảm bảo:

Lưu ý: Lọ có thể bị vỡ, không để gần lửa, không để gần ánh

nóng, không để gần ánh sáng mặt trời.

Đau nhức ngực không ổn định:

Lưu ý: Lọ có thể bị vỡ, không để gần lửa, không để gần ánh

nóng, không để gần ánh sáng mặt trời.

Cách dùng:

Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml có thể truyền tĩnh mạch mà không

cần pha loãng bằng cách đun sôi nước bôi lên với nước.

Người già: Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml có thể được dùng bằng đường

tiêm tĩnh mạch, không cần pha loãng.

Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml có thể được dùng bằng đường tiêm tĩnh

mạch, không cần pha loãng.

Cách dùng sau khi phẫu thuật tĩnh mạch hoặc được dùng với sự trợ

giúp của một lọ lát để đảm bảo tốc độ truyền ổn định.

Trong quá trình điều trị Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml cần đỡ đỡ

nhé và đỡ đỡ cho bệnh nhân.

Lưu ý: Lọ có thể bị vỡ, không để gần lửa, không để gần ánh

nóng, không để gần ánh sáng mặt trời.

CHỐNG ĐỊNH

Không nên sử dụng Glyceryl Trinitrate-hamelin 1 mg/ml trong các trường hợp

như sau:

- Mẫn cảm với hoạt chất, các hợp chất có chứa nitrat khác hoặc bất kỳ

phản ứng không mong muốn.

- Sát khuẩn quá mức (nhạy cảm).

- Sốc tim (trừ khi áp lực rõ ràng có thể cung cấp thêm đường truyền).

- Nhồi máu cơ tim.

- Nhồi máu cơ tim.