

Rx

## Tờ hướng dẫn sử dụng HƯƠNG LIÊN HOÀN

\* Tên thuốc: HƯƠNG LIÊN HOÀN.

\* Khuyến cáo:

“*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*”

“*Để xa tầm tay trẻ em*”

“*Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc*”

\* Thành phần công thức cho 1 gói 4 gam hoàn cứng:

<i>Thành phần hoạt chất</i>	<i>Tên khoa học</i>	<i>Hàm lượng</i>
Bột Hoàng liên	<i>Rhizoma Coptidis</i>	1,6 g
Bột Vân mộc hương	<i>Radix Saussureae lappae</i>	1,6 g
Bột Đại hồi	<i>Fructus Illicii veri</i>	0,04 g
Bột Sa nhân	<i>Fructus Amomi</i>	0,04 g
Bột Quế nhục	<i>Cortex Cinnamomi</i>	0,02 g
Bột Đinh hương	<i>Flos Syzygii aromatici</i>	0,02 g
<i>Thành phần tá dược</i> (Đường trắng, Bột gạo tẻ, Đỏ Erythrosine, Parafin, Nước tinh khiết):		vừa đủ một gói

\* **Dạng bào chế:** Viên hoàn cứng.

\* **Quy cách đóng gói:** Thuốc được đóng Gói 4 gam, 10 gói + 1 tờ HDSD/ hộp.

\* **Chỉ định:** Điều trị tiêu chảy, viêm tiểu tràng, đại tràng, rối loạn tiêu hóa.

\* **Liều dùng và cách dùng:**

Liều dùng: Ngày uống 3 – 4 lần,

+ Trẻ em từ 2 – 7 tuổi: Mỗi lần 1/3 gói.

+ Trẻ em từ 8 – 12 tuổi: Mỗi lần 1/2 gói.

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 1 gói.

Cách dùng: Uống với nước đun sôi để nguội

• **Chống chỉ định:** Không dùng cho phụ nữ có thai và người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

\* **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:**

- **Thận trọng:**

+ Khi sử dụng với người cao huyết áp.

\* **Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

- Chống chỉ định dùng cho phụ nữ có thai

- Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

\* **Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

\* **Tương tác, tương kỵ của thuốc:**

- *Tương tác của thuốc:*

+ Chưa ghi nhận được các tài liệu hoặc báo cáo nào về tương tác của thuốc với các thuốc tây y, nhưng nếu phải dùng đồng thời với thuốc tây y thì tốt nhất nên uống cách nhau 2h

- *Tương kỵ của thuốc:* Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

\* **Tác dụng không mong muốn:** Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Phải thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào xảy ra khi sử dụng thuốc.

\* **Quá liều và cách xử trí:**

- **Quá liều:** Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- **Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều:** Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

\* **Bảo quản:** Để Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 30<sup>0</sup>C.

\* **Hạn dùng của thuốc:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

\* **Tiêu chuẩn:** TCCS

**Cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái**

Địa chỉ: 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái

Đt: 0216 3852 523 - Fax: 0216 3850 364