

LACBIOSYN®

Thuốc bột

Thành phần: Mỗi gói thuốc bột chứa:

Lactobacillus acidophilus 10⁸ CFU

Tá dược vừa đủ 1 gói

(Tá dược: Maltodextrin, Mannitol, Aerosil 200, Bột mùi dâu)

Dạng bào chế: Thuốc bột.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói. Hộp 20 gói.

Hộp 30 gói. Hộp 100 gói.

Tính chất:

- *Lactobacillus acidophilus* là một trực khuẩn cư trú tự nhiên trong đường tiêu hóa, có khả năng sinh ra acid lactic và duy trì môi trường acid để ngăn chặn sự phát triển các vi khuẩn và nấm gây bệnh. Đôi khi thuốc kháng sinh có thể làm phá vỡ sự cân bằng của chúng trong dạ dày và gây ra tiêu chảy.

- Thuốc bột LACBIOSYN® chứa *Lactobacillus acidophilus* ở dạng bột sẽ giúp khôi phục lại sự cân bằng bình thường của vi khuẩn đường ruột và điều trị tiêu chảy, đặc biệt do các vi khuẩn chí ở ruột bị biến đổi do dùng kháng sinh.

Chỉ định:

- Điều trị phụ trợ trong tiêu chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.
- Bổ sung *Lactobacillus acidophilus* bị mất cho hệ vi khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh.

Liều lượng và cách dùng:

Thuốc thường được uống với sữa, nước quả hoặc nước đun sôi để nguội.

- Người lớn: Uống 1 gói/lần x 3 lần/ngày.

- Trẻ em: Uống 1 - 2 gói/ngày.

Chống chỉ định:

- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Không dùng cho người sốt cao trừ khi có chỉ định của Bác sĩ chuyên khoa.
- Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

Thận trọng:

Nếu sau 2 ngày điều trị mà vẫn bị tiêu chảy, cần khám lại. Cần giám sát theo dõi khi dùng chế phẩm chứa *Lactobacillus acidophilus* cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít. Tốt nhất là không dùng khi mang thai.
- Không có chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không gây ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Khi bắt đầu dùng thuốc có hiện tượng sinh hơi trong ruột, nhưng hiện tượng này giảm dần trong quá trình điều trị, đôi khi táo bón.

Thông báo cho Bác sĩ biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

Chưa thấy có dấu hiệu quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

498 Nguyễn Thái Học - Phường Quang Trung - Thành phố Quy

Nhơn - Bình Định - Việt Nam

ĐT: 0256. 3846040 * Fax: 0256. 3846846