

STILUX - 60

ROTUNDIN 60 mg

THUỐC AN THẦN - GÂY NGỦ - GIẢM ĐAU NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

TRÌNH BÀY: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Rotundin (L-tetrahydropalmatin).....60 mg

Tá dược (*Lactose, Tinh bột, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolat, Magnesi stearat, Talc, Quinoline yellow*).....vừa đủ.....1 viên

DƯỢC LÝ:

Dược lực học

Hoạt chất của Stilux-60 là rotundin (L-tetrahydropalmatin) được chiết xuất từ củ Bình vôi (*Stephannia rotunda Lour.*), một loại thảo dược mọc hoang ở các vùng núi Việt Nam, Trung Quốc... Nó đã được sử dụng từ lâu trong dân gian dạng dịch chiết hỗn hợp, nay đã được nghiên cứu đầy đủ về cấu trúc hóa học, tính chất vật lý, độc tính, dược lý học và ứng dụng trên lâm sàng. Kết quả các công trình nghiên cứu của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam đã chứng minh:

+ Rotundin có tác dụng an thần gây ngủ với liều thấp, sau khi ngủ dậy không có cảm giác mệt mỏi hay nhức đầu.

+ Với liều cao hơn, thường gấp đôi liều an thần gây ngủ, thuốc có tác dụng giảm đau rõ rệt, hay được sử dụng giảm đau trong các bệnh đường tiêu hóa, đau khi có kinh, đau đầu.

+ Thuốc còn có tác dụng điều hòa nhịp tim, hạ huyết áp, điều hòa hô hấp, được dùng trong điều trị tăng huyết áp, chữa hen, chữa nấc.

Dược động học:

Kết quả các công trình nghiên cứu của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam cũng đã chứng minh: thuốc được hấp thu tốt khi uống và đạt nồng độ đỉnh trong vòng 1 giờ. Giấc ngủ sẽ đến sau 10-20 phút sau khi uống thuốc và kéo dài 4-6 giờ hoặc có thể lâu hơn tùy liều lượng. Thuốc chuyển hóa một phần qua gan, sản phẩm chuyển hóa có hoạt tính. Thời gian bán thải khoảng 10 giờ. Thuốc được bài tiết chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng chuyển hoá, một phần dưới dạng không đổi.

CHỈ ĐỊNH:

- Dùng trong các trường hợp lo âu, căng thẳng, mất ngủ.
- Sử dụng giảm đau trong các bệnh đường tiêu hóa, đau khi có kinh, đau đầu.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Các trường hợp lo âu, căng thẳng, mất ngủ: uống 1-2 viên trước khi đi ngủ.
- Giảm đau trong các bệnh đường tiêu hóa, đau khi có kinh, đau đầu: uống 2-4 viên chia 2 lần mỗi ngày, có thể dùng đến 8 viên mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người đang vận hành tàu xe, máy móc, người trầm cảm.

THẬN TRỌNG: Có thể gây quen thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thuốc có thể gây nên một số tác dụng phụ (hiếm khi) như: đau đầu, chóng mặt, kích thích vật vã hoặc mất ngủ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có những nghiên cứu đầy đủ về sử dụng rotundin đối với phụ nữ có thai và cho con bú. Do đó, phụ nữ có thai và cho con bú chỉ dùng rotundin khi cần thiết, với liều thấp và trong thời gian ngắn. Cần cân nhắc lợi ích và nguy cơ khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo nào về tương tác của rotundin với thuốc khác hay các dạng tương tác khác.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Traphaco®

Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-24) 36810724 / Fax: (84-24) 36811542

Điện thoại liên hệ: 18006612

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN
Thôn Bình Lương - Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên