



Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
Để Xa Tâm Tay Trẻ Em

Thông Báo Ngay Cho Bác Sĩ Hoặc Dược Sĩ
Những Tác Dụng Không Mong Muốn Gặp Phải Khi Sử Dụng Thuốc

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

- Cao khô hỗn hợp dược liệu	430 mg
(Tương ứng:	
Qui bản (<i>Plastrum Testudinis</i>)	1,5 g
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1,5 g
Hoàng bá (<i>Cortex Phellodendri</i>)	0,5 g
Tri mẫu (<i>Rhizoma Anemarrhenae</i>)	0,5 g
- Tá dược (<i>Lactose, magnesi stearat, ethanol 96%</i>)	vừa đủ 1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

TÁC DỤNG: Tư âm, hạ hỏa.

CHỈ ĐỊNH: Chứng âm hư hỏa vượng; Chữa chứng thận âm hư, hư hỏa bốc hỏa lên gây nhức trong xương, triều nhiệt; ho ra máu, ho khan phiền nhiệt; dễ đói, chân gối đau nhức; lưỡi đỏ rêu ít, mạch sắc hữu lực.

LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Uống 2-3 viên/lần, ngày 2-3 lần.
- Trẻ em: + Từ 6-12 tuổi : Uống 1-2 viên/lần, ngày 2 lần.
+ Từ 12 tuổi trở lên : Dùng như người lớn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Dị ứng với thành phần của bài thuốc; không dùng cho người dương hư, tỳ vị hư hàn và phụ nữ có thai.

THẬN TRỌNG: Khi cảm lạnh, nôn ói, tiêu chảy.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa thấy tác dụng không mong muốn.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Khi dùng thuốc này nên tránh thuốc xổ, tẩy.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác): Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi.

KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC: Uống thêm 1 liều trong thời gian kế tiếp.

QUÁ LIỀU:

- Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Đau bụng, tiêu chảy.

- Cách xử trí khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo thì giảm liều hoặc ngưng dùng và uống thêm nước gừng.

THAM VẤN BÁC SĨ: Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

CHÚ Ý:

- Có thể kết hợp với một số thuốc tân dược hay thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn của thầy thuốc.

- Để đạt hiệu quả nên uống với nước ấm, uống trước bữa ăn 30 - 60 phút với nước muối loãng hoặc nước gừng.

- Một số trường hợp còn cảm lạnh, đầy bụng khi lỡ dùng thuốc cần phải dùng thêm một số gia vị cay nóng hoặc một số thuốc trị cảm lạnh, đầy bụng như: hành, gừng, tiêu, vỏ quýt hoặc vỏ cam hay một số thuốc: ma hoàng thang, quế chi thang... tùy tình trạng bệnh.

- Bệnh suyễn: thuốc có tác dụng tốt đối với bệnh suyễn ở thể hư - thực nhiệt; không phù hợp với thể hư - thực hàn.

- Với bệnh cao huyết áp: thuốc có tác dụng tốt với bệnh cao huyết áp thể âm hư dương xung, các thể khác không phù hợp nhất là thể đàm thấp.

- Với bệnh tiểu đường: thuốc có tác dụng tốt với thể có các triệu chứng như trên.

- Thuốc chữa theo chứng “Âm hư hỏa vượng” nên khi nào còn các chứng trên thì dùng thuốc, hết chứng thì ngưng dùng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Sản phẩm có bán online tại: www.vanxuanpharma.com.vn

Liên hệ Hotline: 0931.288.789. Giao hàng toàn quốc.

CÔNG TY TNHH VAN XUÂN

231 Chiến Lược, KP.18, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam
Sản xuất tại: Đường số 3, Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - ĐT: (028) 37624848 - Fax: (028) 37624848

Website: vanxuanpharma.com.vn