

Rx-Thuốc kê đơn

TADIMAX

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để thuốc xa tầm tay trẻ em

THÀNH PHẦN-HÀM LƯỢNG:

Mỗi viên nén bao phim chứa	
- Cao khô alkaloid Trinh nữ hoàng cung.....	80 mg
Tương ứng với 2000 mg lá Trinh nữ hoàng cung (<i>Folium Crini latifolii</i>)	
- Cao khô hỗn hợp.....	320 mg
Tương ứng với:	
Tri mẫu (<i>Rhizoma Anemarrhenae</i>).....	666 mg
Hoàng bá (<i>Cortex Phellodendri</i>).....	666 mg
Ích mẫu (<i>Herba Leonuri japonici</i>).....	666 mg
Đào nhân (<i>Semen Pruni</i>).....	83 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>).....	830 mg
Xích thược (<i>Radix Paeoniae</i>).....	500 mg
- Nhục quế (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	8,3 mg
- Tá dược (Eragel, lactose monohydrat, povidon K30, sodium starch glycollat, Aerosil, magnesi stearat, HPMC 606, HPMC 615, talc, titan dioxide, PEG 6000, màu oxyd sắt đen, màu oxyd sắt đỏ) vừa đủ.....	1 viên

DẠNG BÀO CHẾ

Viên nén dài bao phim màu nâu, mặt viên nhẵn bóng, lành lặn, mùi thơm dược liệu.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG

- Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
- Uống sau bữa ăn. Uống liên tục trong ít nhất 2 tháng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bí tiểu hoàn toàn do các nguyên nhân khác.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Uống thuốc sau bữa ăn.

Thuốc có chứa lactose, những bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase, hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thuốc chống chỉ định đối với phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

- Thuốc có thể gây những tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua như rối loạn tiêu hóa, mẩn ngứa, chóng mặt. Các tác dụng này thường hết sau 3 - 5 ngày dùng thuốc, không có trường hợp nào nặng phải ngừng dùng thuốc. Thuốc không ảnh hưởng đến mạch và huyết áp.
- Thuốc không làm thay đổi chỉ số PSA, không ảnh hưởng đến huyết học và chức năng gan thận.

Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

CÁC ĐẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO

- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc khi có nghi ngờ về chất lượng thuốc.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ x 42 viên, hộp 2 vỉ x 21 viên, hộp 3 vỉ x 21 viên, lọ 1000 viên, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THUỐC

- Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 08/03/2019

Cơ sở sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng

Tel: 0236.3760130 Fax: 0236.3760127

Email: Info@danapha.com

Điện thoại tư vấn: 0236.3760131

Và phân phối trên toàn quốc