

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thành phần (Cho 01 viên nang cứng):

Thành phần dược chất: Mỗi viên nang cứng chứa 480,0 mg cao khô hỗn hợp được liệu tương đương với các chất được chiết xuất từ:

Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis</i>).....	660,0 mg
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	440,0 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>).....	352,0 mg
Cam thảo (<i>Radix et Rhizoma Glycyrrhizae</i>).....	352,0 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	440,0 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	352,0 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>).....	440,0 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>).....	660,0 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>).....	660,0 mg
Quế nhục (<i>Cortex Cinnamomi</i>).....	440,0 mg
Thành phần tá dược: Talc, magnesi stearate.....	vừa đủ 01 viên.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng số 0, màu đỏ, bên trong chứa bột thuốc màu nâu nhạt, mùi thơm được liệu, vị ngọt đắng.

Tác dụng - Chỉ định:

- **Tác dụng:** Bổ khí, kiện tỳ, bổ huyết.
- **Chỉ định:** Bồi bổ khí huyết, cơ thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn, phụ nữ mới sinh. Dùng cho người có sắc mặt xanh xao, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân lạnh, kinh nguyệt ra nhiều.

Liều dùng - Cách dùng: Mỗi lần uống 1 viên. Ngày uống 2-3 lần.

Chống chỉ định:

- Người đang tiêu chảy.
- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Không dùng quá liều chỉ định.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc:

- Tương tác: Chưa có báo cáo.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.
- Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí:

- Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Khi dùng thuốc quá liều cần tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

- Hộp 01 túi metalight x 02 vỉ x 10 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 túi metalight x 05 vỉ x 10 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ 30 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 01 lọ 60 viên nang cứng và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Bảo quản: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Sản xuất tại: Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà.

Số 2A - Phố Lý Bôn - Phường Tiên Phong - Thành phố Thái Bình -
Tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3641546/ 0227.3647286 - Fax: 0227.3641548